

云南省蚱总科四新种 (直翅目)

郑哲民

陕西师范大学动物研究所 西安 710062

摘 要 记述采自云南省蚱总科昆虫 4 新种, 即断脊羊角蚱 *Criotettix interrupticostus* sp. nov., 勐腊波蚱 *Bolivaritettix menglaensis* sp. nov., 黄条尖顶蚱 *Teredorus flavistriatus* sp. nov. 及昆明微翅蚱 *Alu latettix kunmingensis* sp. nov., 此外记述云南羊角蚱 *Criotettix yunnanensis* Zheng et Ou 及瘤背大磨蚱 *Macromotettix torulisinota* Zheng 的新发现的雄性。模式标本保存于陕西师范大学动物研究所昆虫标本室。

关键词 直翅目, 蚱总科, 新种, 云南.

中图分类号 Q969. 26

2004 年 7~ 8 月, 陕西师范大学动物研究所在云南省西双版纳傣族自治州、昆明市及大理白族自治州进行蚱类昆虫调查, 在采到的标本中经过鉴定, 发现有刺翼蚱科 1 新种 1 新雄性, 短翼蚱科 1 新种 1 新雄性, 蚱科 2 新种, 记述如下。模式标本保存于陕西师范大学动物研究所昆虫标本室。

1 断脊羊角蚱, 新种 *Criotettix interrupticostus* sp. nov. (图 1~ 2)

雄性 体小型, 头部不突出于前胸背板之上。头顶的宽度与一复眼等宽, 前缘弧形, 略突出于复眼




图 1~ 2 断脊羊角蚱, 新种 *Criotettix interrupticostus* sp. nov. (♂)

1. 整体背面 (body, dorsal view) 2. 整体侧面 (body, lateral view)

之前, 中隆线明显; 侧面观, 头顶与颜面隆起成钝圆形, 颜面隆起在触角之间略突出; 纵沟在触角之间部分的宽度与触角基节等宽。触角丝状, 着生于复眼前缘下 1/3 处, 14 节, 中段一节的长为宽的 5~ 6 倍。复眼圆球形, 突出; 侧单眼位于复眼前缘的中部。前胸背板背面密具细碎小瘤突; 前缘平直, 中隆线断裂不完整, 侧面观, 背板上缘呈波状; 侧隆线在沟前区平行; 肩角近弧形, 在肩部之间具 1 对短纵隆线; 后突楔状, 刚到达后足股节顶端; 前胸背板侧片外翻, 后缘具 2 凹陷, 后角刺状, 平伸。前翅狭长卵形, 顶圆形; 后翅短缩, 不到达前胸背板后突的顶端。前、中足股节上、下缘平直, 中足股节的宽度与前翅可见部分等宽; 后足股节粗短, 膝前齿尖锐, 膝齿钝; 后足胫节内、外侧均具刺 7 个; 后足跗节第 1 节长于第 3 节, 第 1 跗节下之第 1、2 垫小, 顶尖, 第 3 垫大, 顶钝。下生殖板短锥形。

体暗褐色, 后翅黑色, 前、中足股节及胫节上具不明显的暗色横斑 2 个, 第 1 跗节及第 2 跗节端部暗色, 后足股节下侧外面黑色, 后足胫节褐色。

雌性: 未知。

♂体长 8~ 9 mm, 前胸背板长 8~ 9 mm, 后足股节长 5~ 7 mm。

正模 ♂, 云南勐腊 (南贡山), 2004-07-25, 卜云采; 副模 1 ♂, 同正模。

新种近似于版纳羊角蚱 *Criotettix bannanensis* Zheng et Xie, 主要区别见表 1。

词源: 种名以拉丁词 *interrupt* 和 *costa* 组成, 表示前胸背板中隆线断裂。

表 1 断脊羊角蚱与版纳羊角蚱之主要区别

Table 1. Difference between *C. interrupticostus* sp. nov. and *C. bannanensis*.

版纳羊角蚱 <i>Criolettix bannanensis</i>	断脊羊角蚱, 新种 <i>Criolettix interrupticostus</i> sp. nov.
前胸背板背面光滑	前胸背板背面密具细碎小瘤突
前胸背板中隆线全长不断裂	前胸背板中隆线断裂不完整
头顶的宽度狭于一复眼的宽度	头顶的宽度与一复眼等宽

2 勐腊波蚱, 新种 *Bolivaritettix menglaensis* sp. nov. (图 3~ 5)

雄性 体小型, 头部不突出于前胸背板之上。头顶的宽度与 1 复眼等宽, 前缘平直, 不突出于复眼前; 侧面观, 头顶与颜面隆起成圆形, 颜面隆起在触角之间弧形突出; 纵沟较宽, 其宽度略大于触角基节宽。复眼近三角形, 突出; 侧单眼位于复眼前缘的中部。触角丝状, 14 节, 着生于复眼下缘之间。前胸背板背面较平滑, 前缘平直, 中隆线全长明显; 侧面观背板上缘平直; 沟前区侧隆线略向后收缩; 肩角近钝角形, 在肩部之间具 1 对短纵隆线; 后突长锥形, 超过后足股节顶端, 其超出部分长约 2 mm; 前胸背板侧片外翻, 后缘具 2 凹陷, 后角顶平截。前翅宽卵形, 其可见部分宽于中足股节的宽度; 后翅发达, 超过前胸背板后突的顶端, 其超出部分长约 1 mm; 前、

中足股节上、下缘平直; 后足股节粗壮, 长为宽的 2.5 倍, 膝前齿及膝齿直角形; 后足胫节外侧具刺 7 个, 内侧具刺 8 个, 后足跗节第 1 节长于第 3 节, 第 1 跗节下之第 1、2 垫小, 顶尖, 第 3 垫大, 顶钝。下生殖板短锥形, 顶钝。

体暗褐色, 有的个体在肩部具 1 白色横斑; 后翅黑色; 前、中足股节及胫节上具 2 黑色横斑, 第 1 跗节及第 2 跗节端部黑色; 后足股节下侧外面黑色; 后足胫节褐色, 上具 2 黑色横斑; 第 2 跗节及第 3 跗节端部黑色。

雌性 体较雄性略粗; 产卵瓣狭长, 上瓣之长为宽的 5 倍, 上、下瓣外缘均具细齿。下生殖板近圆形, 后缘具 3 个钝突起。体色同雄性。

体长: ♂8.3~ 9.0 mm, ♀ 9~ 10 mm; 前胸背板长: ♂10.0~ 10.5 mm, ♀ 9~ 10 mm; 后足股节长: ♂5.5~ 6.0 mm, ♀ 5~ 8 mm。

正模 ♂, 云南勐腊 (南贡山), 2004-07-25, 卜云采; 副模, 2 ♂♂, 2 ♀♀, 同正模。

新种近似于瘤背波蚱 *Bolivaritettix tuberdorsalis* Liang, 主要区别见表 2。

表 2 勐腊波蚱与瘤背波蚱之主要区别
Table 2. Difference between *B. menglaensis* sp. nov. and *B. tuberdorsalis*.

瘤背波蚱 <i>Bolivaritettix tuberdorsalis</i>	勐腊波蚱, 新种 <i>Bolivaritettix menglaensis</i> sp. nov.
前胸背板背面密具瘤突	前胸背板背面较平滑
肩部之间不具 1 对短纵隆线	肩部之间具 1 对短纵隆线
后突超过后足股节顶端部分长约 1.3~ 1.7 mm	后突超过后足股节顶端部分长约 2 mm
中足股节宽于前翅宽	中足股节狭于前翅宽
后足胫节黄褐色	后足胫节上具 2 黑色横斑

词源: 种名以模式产地为名。

3 黄条尖顶蚱, 新种 *Teredorus flavistriat* sp. nov. (图 6~ 8)

雌性 体小型, 体长 (自头顶前缘至前胸背板后突顶端) 为体宽 (前胸背板侧片后角之间的宽度) 的 6 倍。头部不突出于前胸背板之上, 背面观, 头顶极向前狭, 两复眼很接近, 中隆线明显, 不到达后头; 侧面观, 头顶与颜面隆起成圆形, 颜面隆起在复眼前直, 不凹陷, 在触角之间略突出, 在中央单眼处凹陷; 纵沟在触角之间部分的宽度略狭于触角基节宽。触角丝状, 15 节, 着生于复眼稍下处, 触角窝的上缘与复眼下缘处于同一水平线上, 中段一节的长度为宽度的 5~ 6 倍。复眼圆球形, 突出; 侧单眼位于复眼前缘的中部。前胸背板较平滑, 具细小颗粒; 前缘平直, 中隆线全长明显; 侧面观背板上缘在肩部前略




图 3~ 5 勐腊波蚱, 新种 *Bolivaritettix menglaensis* sp. nov.
3. 整体背面 (♂, body, dorsal view) 4. 整体侧面 (♂, body, lateral view) 5. 雌性下生殖板 (♀, subgenital plate)




图6~8 黄条尖顶蚱, 新种 *Teredorus flavistrial* sp. nov. (♀)

6. 整体背面 (body, dorsal view) 7. 整体侧面 (body, lateral view) 8. 下生殖板 (subgenital plate)

波状, 在肩部后平直; 肩角钝角形; 后突长锥形, 超过后足股节顶端而达后足胫节顶端, 其超出部分长约6mm, 前胸背板总长为超出后足股节顶端部分长的2.8倍; 前胸背板侧片后缘具2凹陷, 后角向下, 顶圆形。前翅宽长, 顶尖圆; 后翅发达, 略超过后突的顶端。前、中足股节上、下缘平直, 中足股节的宽度明显狭于前翅可见部分的宽度; 后足股节粗壮, 膝前齿直角形, 膝齿较尖; 后足胫节内、外侧均具刺5个; 后足跗节第1节长于第3节, 第1跗节下之第1、2垫小, 第3垫较大, 各垫顶钝。产卵瓣粗短, 上瓣之长为宽的3倍, 上、下瓣外缘均具细齿。下生殖板长宽近相等, 基部狭, 中部扩大, 后缘中央三角形突出。

体黑褐色, 身体背面自头顶到后突顶端具一条黄色宽纵条纹; 后翅黑色; 前、中足股节及胫节上具2黑色横斑, 第1跗节及第2跗节端部黑色; 后足股节外侧黑褐色, 内侧黑色; 后足胫节黑色; 后足第2跗节及第3跗节端部黑色。

雄性: 未知。

♀ 体长 (从头顶至后突顶端) 18.0~18.3 mm, 前胸背板长 16.0~16.5 mm, 后足股节长 5.5~6.0 mm。

正模♀, 云南勐仑 (五道班), 2004-07-31, 卜云采; 副模1♀, 同正模。

新种近似于武夷山尖顶蚱 *Teredorus wuyishanensis* Zheng, 主要区别见表3。

表3 黄条尖顶蚱与武夷山尖顶蚱之主要区别

Table 3. Difference between *T. flavistrial* sp. nov. and *T. wuyishanensis*.

武夷山尖顶蚱 <i>Teredorus wuyishanensis</i>	黄条尖顶蚱, 新种 <i>Teredorus flavistrial</i> sp. nov.
体长为体宽的5倍	体长为体宽的6倍
前胸背板总长为超出后足股节顶端部分长的3.3倍	前胸背板总长为超出后足股节顶端部分长的2.8倍
雌性下生殖板后缘中央凹陷	雌性下生殖板后缘中央三角形突出
后足胫节暗褐色	后足胫节黑色
体背不具黄色纵条纹	体背具黄色纵条纹

词源: 种名以拉丁词 *flav* 和 *stri* 组成, 表明体背具黄条。

4 昆明微翅蚱, 新种 *Alulatettix kunmingensis* sp. nov. (图9~11)

雌性 体小型, 粗壮。头顶突出于复眼之前, 前缘平直, 具中隆线, 头顶的宽度为一复眼宽的2倍; 侧面观, 头顶与颜面隆起成直角形, 颜面隆起在侧单眼前略凹陷, 在触角之间弧形突出; 纵沟宽, 在触角之间的宽度略大于触角基节的宽度。触角丝状, 着




图9~11 昆明微翅蚱, 新种 *Alulatettix kunmingensis* sp. nov.

9. 整体背面 (body, dorsal view) 10. 整体侧面 (body, lateral view) 11. 雌性下生殖板 (♀, subgenital plate)

生于复眼下缘之间, 14 节, 中段一节的长度为宽度的 4~5 倍。复眼圆球形, 侧单眼位于复眼前缘的中部。前胸背板屋脊形, 侧面观背板上缘弧形隆起; 前缘钝角形突出, 其顶端到达复眼之间的中部; 沟前区侧隆线平行; 前胸背板后突刚到达后足股节的膝部, 背面观端部中央凹陷; 前胸背板侧片后缘具 2 凹陷, 后角顶圆形。前翅极小, 刚到达第 1 腹节背板基部; 后翅短缩, 到达第 2 腹节。前、中足股节较短, 上、下缘平直; 后足股节粗短, 膝前齿及膝齿钝; 后足胫节外侧具刺 9 个, 内侧具刺 7 个; 后足跗节第 1 节长于第 3 节, 第 1 跗节下之第 1、2 垫小, 第 3 垫大, 各垫顶尖。产卵瓣较粗短, 上瓣之长为宽的 3 倍, 上、下瓣之外缘均具细齿。下生殖板长略大于宽, 后缘具 3 齿。

体黑褐色, 有的个体背板上具 2~4 个黑斑; 前、中足股节及胫节上具不明显的暗色横斑 2 个, 第 1 跗节及第 2 跗节端部暗色; 后足股节下侧外面黑色, 后足胫节褐色。

雄性 体较雌性小, 前、中足股节明显宽扁; 下生殖板短锥形。其余特征及体色同雌性。

体长: ♂6.0~6.5 mm, ♀9~10 mm; 前胸背板长: ♂6 mm, ♀7~8 mm; 后足股节长: ♂5.5~5.0 mm, ♀5.5~6.0 mm。

正模♀, 云南昆明, 2004-08-05, 卜云采; 副模, 2 ♂♂, 2 ♀♀, 同正模。

新种近似于楚雄微翅蚱 *Alulatettix chuxiongensis* Zheng, 主要区别见表 4。

表 4 昆明微翅蚱与楚雄微翅蚱之主要区别

Table 4. Difference between *A. kunmingensis* sp. nov. and *A. chuxiongensis*.

楚雄微翅蚱 <i>Alulatettix chuxiongensis</i>	昆明微翅蚱, 新种 <i>Alulatettix kunmingensis</i> sp. nov.
头顶的宽度为一复眼宽的 1.6 倍	头顶的宽度为一复眼宽的 2 倍
侧面观, 颜面隆起在侧单眼前直	侧面观, 颜面隆起在侧单眼前略凹陷
前胸背板前缘仅到达复眼后缘	前胸背板前缘到达复眼之间的中部
沟前区侧隆线略向后收缩	沟前区侧隆线平行
中足股节下缘波状	中足股节下缘平直
雌性下生殖板后缘具一细长三角形突出	雌性下生殖板后缘具 3 齿
后足胫节端半部黑褐色	后足胫节全褐色

词源: 种名以模式产地为名。

5 云南羊角蚱 *Criotettix yunnanensis* Zheng et Ou 新雄性

Criotettix yunnanensis Zheng et Ou, 2003. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 28 (4): 647-675.

云南羊角蚱发表于 2003 年, 标本采自云南宜良, 当时根据 2 头雌性描述而发表, 2004 年 8 月, 在云南省大理地区进行采集时, 采到 2 ♂♂和 1 ♀, 首次发现的雄性描述如下。

雄性 体小型, 狭长, 头部不突出于前胸背板之上; 头顶的宽度与一复眼等宽, 头顶前缘不突出于复眼之前; 中隆线明显, 侧缘略反折; 侧面观, 头顶与颜面隆起成直角形, 颜面隆起在触角基部之间略突出; 纵沟狭, 在触角之间的宽度狭于触角基节的宽度。触角丝状, 着生于复眼下缘之间, 15 节, 中段一节的长度为宽度的 5~6 倍。复眼圆球形, 突出; 侧单眼位于复眼前缘的中部。前胸背板背面较平滑, 在肩部后具稀疏小瘤突; 前缘平直, 中隆线全长明显; 侧面观背板上缘平直, 沟前区侧隆线平行; 肩角钝角形, 在肩部之间具 1 对短纵隆线; 后突长锥形, 到达后足胫节顶端; 前胸背板侧片外翻, 后缘具 2 凹陷, 后角呈锐角状。前翅长卵形, 顶宽圆, 其宽度略宽于中足股节的宽度; 后翅发达, 到达后突的顶端。前、中足股节细长, 上、下缘近平直; 后足股节长为宽的 3.5 倍, 膝前齿及膝齿直角形; 后足胫节外侧具刺 6 个, 内侧具刺 5 个; 后足跗节第 1 节长度为第 3 节长的 1.3 倍, 第 1 跗节下之 3 个垫近等长。下生殖板锥形, 顶尖。

体暗黄褐色, 后翅黑色; 前、中足股节黑褐色, 胫节黑褐色, 上具 2 淡色横斑, 第 1 跗节及第 2 跗节端部黑色; 后足股节外侧具 2 个大黑色横斑, 内侧黑色; 后足胫节黑褐色, 近基部具较淡的横斑。

♂体长 10.0~10.5 mm, 前胸背板长 15~16 mm, 后足股节长 7.0~7.5 mm。


分布: 2 ♂♂, 1 ♀♀, 云南大理(苍山) 2004-08-11, 卜云采。

6 瘤背大磨蚱 *Macromotettix torulisinota* Zheng 新雄性 (图 12)

Macromotettix torulisinota Zheng, 1998. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 23 (2): 173.

瘤背大磨蚱发表于 1998 年, 标本采自云南省勐仑, 当时根据 1 头雌性描述发表, 2004 年 7 月, 在云南省勐腊地区进行采集时, 采到 1 ♂和 1 ♀, 将首次发现的雄性描述如下。

雄性 体小型, 头部不突出于前胸背板之上; 头顶的宽度为一复眼宽的 1.3 倍, 侧缘向前略收缩, 前缘略突出于复眼之前; 中隆线明显, 侧面观, 头顶与颜面隆起成钝圆角形, 颜面隆起在触角基部之间略弧形突出; 颜面隆起纵沟在触角之间的宽度与触角基节等宽。触角丝状, 16 节, 着生于复眼下缘之



12

图 12 瘤背大磨蚱 *Macromotettix torulisinota* Zheng, 前胸背板侧面观 (♂, pronotum, lateral view)

间, 中段一节的长度为宽度的 5~6 倍。复眼圆球形, 突出; 侧单眼位于复眼前缘的中部。前胸背板背面密具小瘤突; 前缘平直, 中隆线全长明显; 侧面观背板上缘在肩部前略突出, 在肩部后呈波状; 侧隆线在沟前区略向后收缩; 肩角钝圆角形, 在肩部之间具一对短纵隆线; 前胸背板后突楔状, 顶端刚到达后足股节膝部; 前胸背板侧片后缘具 2 凹陷, 后角顶端平截; 肩顶隆线与侧片下缘的联结点位于下缘 4/5 处。前翅长卵形, 顶宽圆; 后翅刚到达前胸背板后突的顶端。前、中足股节下缘略波状; 中足股节的宽度为前足股节宽的 1.3 倍, 而略宽于前翅可见部分的宽度; 中足股节的长度约为前翅长的 1.3 倍; 后足股节长为宽的 2.5 倍, 膝前齿直角形, 膝齿略尖; 后足胫节外侧具刺 4 个, 内侧具刺 6 个; 后足跗节第 1 节长于第 3 节长的 1.7 倍, 第 1 跗节下之第 3 垫大于第 1、2 垫, 顶尖。下生殖板锥形。

体暗黄褐色, 背面色较深; 后翅黑色; 前、中足股节及胫节上具 2 黑色横斑; 第 1 跗节及第 2 跗节端部黑色; 后足股节下侧外面黑色; 后足胫节黑褐色; 后足跗节第 2 节及第 3 节端部黑色。

♂ 体长 6.5 mm, 前胸背板长 6.5 mm, 后足股节长 5.8 mm。

分布: 1 ♂, 1 ♀, 云南勐腊 (南贡山) 2004-07-25, 卜云采。

REFERENCES (参考文献)

Gunther, K. 1938. Revision der Acrydiinae II. Scelimenae spuriae.

FOUR NEWSPECIES OF TETRIGOIDEA (ORTHOPTERA) FROM YUNNAN PROVINCE, CHINA

ZHENG Zhe Min

Institute of Zoology, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China

Abstract In the present paper, four new species of Tetrigoidea are described from Yunnan Province. Type specimens are deposited in the Institute of Zoology, Shaanxi Normal University.

1 *Criotettix interrupticostus* sp. nov. (Figs. 1-2)

This new species is allied to *Criotettix bannanensis*

Stettiner Entomologische Zeitung, 99: 161-230.

Gunther, K. 1939. Revision der Acrydiinae (Orthoptera) III. Section amorphopoi (Metrodorae Bol. 1887 acut.). *Abhandlungen und Berichte der Museum für Tierkunde und Völkerkunde zu Dresden* (A), 20: 1-335.

Jiang G F and Zheng, Z M 1998. Grasshoppers and Locusts from Guangxi. Guangxi Normal University Press, Guilin. 1-390. [蒋国芳, 郑哲民, 1998. 广西蝗虫. 桂林: 广西师范大学出版社. 1-390]

Liang G Q 2002. Orthoptera, Tetrigoidea. Forest Insects of Hainan. Science Press, Beijing. 97-98. [梁铭球, 2002. 直翅目, 蚱总科. 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社. 97-98]

Liang G Q and Zheng, Z M 1998. Fauna Sinica Insecta, Vol. 12, Orthoptera, Tetrigoidea. Science Press, Beijing. 1-278. [梁铭球, 郑哲民, 1998. 中国动物志, 昆虫纲, 第 12 卷, 直翅目, 蚱总科. 北京: 科学出版社, 1-278]

Zheng, Z M 1998. A study of Tetrigoidea from Xishuangbanna (Orthoptera). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 23 (2): 161-184. [郑哲民, 1998. 西双版纳地区蚱总科的研究 (直翅目). 动物分类学报, 23 (2): 161-184]

Zheng, Z M and Xie, L D 2000. New species of Tetrigoides from Xishuangbanna (Orthoptera). *J. Shaanxi Normal University*, 28 (3): 90-95. [郑哲民, 谢令德, 2000. 西双版纳地区蚱总科新种记述. 陕西师范大学学报, 28 (3): 90-95]

Zheng, Z M and Zhong, Y-L 2001. The genus *Alulatettix* Liang from China (Orthoptera: Tetrigoidea: Tetrigidae). *Oriental Insects*, 33: 193-202.

Zheng, Z M and Xie, L D 2002. Two new species of the genus *Criotettix* Bolivar from Guangxi (Tetrigoidea: Scelimenidae). *Acta Entomologica Sinica*, 45 (Suppl.), 68. [郑哲民, 谢令德, 2002. 广西羊角蚱属二新种 (蚱总科: 刺翼蚱科). 昆虫学报, 45 (增刊): 6-8]

Zheng, Z M 2002. Three new species of Tetrigoidea from Napo Area of Guangxi, China (Orthoptera: Tetrigoidea). *Zoological Research*, 23 (4): 315-318. [郑哲民, 2002. 广西那坡地区蚱总科三新种 (直翅目: 蚱总科). 动物学研究, 23 (4): 315-318]

Zheng, Z M and Ou, X H 2003. Four new species of Scelimenidae from Yunnan Province (Orthoptera, Tetrigoidea). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 28 (4): 673-678. [郑哲民, 欧晓红, 2003. 云南省刺翼蚱科四新种记述 (直翅目: 蚱总科). 动物分类学报, 28 (4): 673-678]

Zheng, Z M and Qu, X H 2004. Four new species of *Tetrix* Latreille from Yunnan Province (Orthoptera, Tetrigidae). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 29 (4): 725-729. [郑哲民, 欧晓红, 2004. 云南省蚱属四新种记述 (直翅目: 蚱科). 动物分类学报, 29 (4): 725-729]

Zheng et Xie, but differs in: 1) disc of pronotum with numerous small tubercles; 2) midkeel of pronotum interrupted; 3) width of vertex equal to the width of an eye.

♂ Length of body 8-9 mm, length of pronotum 8 mm, length of hind femur 5-7 mm.

Holotype ♂, Yunnan, Mengla (21° 8' N,

101°6' E), 25 July 2004, collected by BU Yun.

Paratype 1 ♂, same data as holotype.

Etymology. The specific name is derived from the Latin *interrupt* and *costa*, referring the interrupted midkeel of pronotum.

2 *Bolivaritettix menglaensis* **sp. nov.** (Figs. 3-5)

This new species is allied to *Bolivaritettix tuberdorsalis* Liang, but differs in: 1) disc of pronotum smooth; 2) with a pair short longitudinal keels between shoulders; 3) the part of hind process which beyond the top of hind femur about 2 mm; 4) width of midfemur narrower than the width of elytra; 5) hind tibia with two black bands.

Length of body: ♂ 8.5-9.0 mm, ♀ 10.5 mm.

Length of pronotum: ♂ 10.0-10.5 mm, ♀ 9-10 mm.

Length of hind femur: ♂ 5.5-6.0 mm, ♀ 5-6 mm.

Holotype ♂, Yunnan, Mengla (101°6' E, 21°8' N), 25 July 2004, collected by BU Yun.

Paratypes: 2 ♂♂, 2♀♀, same data as holotype.

Etymology. The specific name is from the type locality Mengla, Yunnan.

3 *Teredorus flavistriatus* **sp. nov.** (Figs. 6-8)

This new species is allied to *Teredorus wuyishanensis* Zheng, but differs in: 1) length of body 6 times the width of body; 2) length of pronotum 2.8 times the part which beyond the top of hind femur; 3) in the middle of hind margin of subgenital plate of female with a triangular process; 4) hind tibia black;

5) with a wide longitudinal yellow stripe on the disc of pronotum.

♀ Length of body 18.0-18.5 mm, length of pronotum 16.0-16.5 mm, length of hind femur 5.5-6.0 mm.

Holotype ♀, Yunnan, Mengla (101°2' E, 21°4' N), 31 July 2004, collected by BU Yun.

Paratype 1 ♀, same data as holotype.

Etymology. The specific name is derived from the Latin *flav* and *stri*, referring the pronotum with yellow stripe.

4 *Alulatettix kunmingensis* **sp. nov.** (Figs. 9-11)

This new species is allied to *Alulatettix chuxiongensis* Zheng, but differs in: 1) width of vertex 2 times the width of an eye; 2) in profile, frontal ridge slightly concave before lateral ocelli; 3) anterior margin of pronotum reaching the middle of eyes; 4) lateral keels parallel in prozona; 5) lower margin of midfemur straight; 6) hind margin of subgenital plate of female with three teeth; 7) hind tibia brown.

Length of body: ♂ 6.0-6.5 mm, ♀ 9-10 mm.

Length of pronotum: ♂ 6 mm, ♀ 7-8 mm. Length of

hind femur: ♂ 5.0-5.1 mm, ♀ 5.5-6.0 mm.

Holotype ♀, Yunnan, Kunming (25°2' N, 102°8' E), 5 Aug. 2004, collected by BU Yun.

Paratypes: 2 ♂♂, 2♀♀, same data as holotype.

Etymology. The specific name is from the type locality Kunming, Yunnan Province.

Key words Orthoptera, Tetrigoidea, new species, Yunnan.